

Uro-Vaxom®

Chất ly giải vi khuẩn đông khô *Escherichia coli* 6 mg



TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH ĐƯỜNG TIẾT NIỆU

- ▶ Điều trị phòng ngừa nhiễm khuẩn đường tiết niệu dưới tái phát
- ▶ Điều trị hỗ trợ nhiễm khuẩn đường tiết niệu cấp tính




Quy cách đóng gói:


Hộp 3 vỉ nhôm, mỗi vỉ chứa 10 viên nang

LIỀU DÙNG

Điều trị dự phòng
nhiễm khuẩn
tiết niệu tái phát



Điều trị hỗ trợ
nhiễm khuẩn
tiết niệu cấp



Số Visa: 760410251623

Tài liệu gồm 2 trang
thông tin chi tiết xem ở trang 1 & 2



Nhà sản xuất:
OM PHARMA SA
Rue du Bois-du-Lan 22, 1217
Meyrin, Geneva, Thụy Sĩ

Địa chỉ liên hệ: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN EVER NEURO PHARMA GMBH
Tại Hà Nội: Tầng 3, số 18 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm - 024. 38251243
Tại Đà Nẵng: Số 06 Trần Phú, Thạch Thang, Hải Châu - 0236. 3810430
Tại TP. Hồ Chí Minh: 111-121 Ngô Gia Tự, phường 2, Q10 - 028. 62787860

Uro-Vaxom®



Thành phần công thức thuốc:

Thành phần hoạt chất: Chất ly giải vi khuẩn đông khô *Escherichia coli* 6 mg

Thành phần tá dược: Tinh bột (pre-gelatinised), magnesium stearate, propyl gallate (E310), sodium glutamate, mannitol.

Thành phần của vỏ nang: gelatin, oxit sắt vàng (E 172), oxit sắt đỏ (E 172) và titanium dioxide (E171).

Dạng bào chế:

Mỗi viên nang chứa 6 mg chất ly giải vi khuẩn đông khô *Escherichia coli*.

Chỉ định:

Điều trị tăng cường miễn dịch trong phòng ngừa nhiễm khuẩn đường tiết niệu dưới tái phát và điều trị hỗ trợ nhiễm khuẩn đường tiết niệu cấp tính.

Cách dùng, liều dùng:

Điều trị dự phòng hoặc bổ sung: 1 viên 6mg 1 ngày, uống vào buổi sáng khi đói trong 3 tháng liên tục

Điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu cấp: 1 viên 6mg 1 ngày, uống vào buổi sáng khi đói để hỗ trợ điều trị nhiễm khuẩn thông thường cho đến khi hết triệu chứng nhưng ít nhất trong 10 ngày liên tiếp.

Liều cụ thể khuyến cáo:

Trẻ em: Tính an toàn và hiệu quả của Uro-Vaxom chưa được nghiên cứu ở trẻ em dưới 4 tuổi.

Người cao tuổi: Không cần điều chỉnh liều do tuổi tác.

Bệnh nhân suy gan hoặc suy thận: Không có dữ liệu cụ thể về tính an toàn và hiệu quả của Uro-Vaxom ở những bệnh nhân bị suy gan hay thận. Do đó không có liều khuyến cáo cho bệnh nhân này.

Chống chỉ định: Mẫn cảm với hoạt chất chính hoặc bất kỳ tá dược nào được ghi trong mục "Thành phần công thức thuốc"

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

Uro-Vaxom có thể gây phản ứng quá mẫn như phản ứng da, sốt hoặc phù nề. Trong trường hợp này cần phải dừng điều trị vì có thể có phản ứng dị ứng.

Phương pháp điều trị ức chế miễn dịch có thể làm giảm hoặc ngăn chặn hiệu quả điều trị của Uro-Vaxom.

Hiệu quả và độ an toàn của Uro-vaxom chưa được xác định ở trẻ em dưới 4 tuổi.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Phụ nữ có thai: Có rất ít dữ liệu về việc sử dụng Uro-Vaxom ở phụ nữ mang thai. Một nghiên cứu thí điểm được tiến hành với một nhóm nhỏ các phụ nữ mang thai (n = 62) bị nhiễm trùng đường tiết niệu cấp tính (UTI) trong suốt quý hai của thai kỳ cho đến khi sinh. Không có nghiên cứu nào được thực hiện ở phụ nữ trong 3 tháng đầu của thai kỳ.

Uro-Vaxom chỉ nên sử dụng trong quá trình mang thai khi lợi ích mang lại cao hơn những nguy cơ tiềm ẩn. Điều này đặc biệt đúng trong quý đầu của thai kỳ.

Phụ nữ cho con bú: Vì chưa có dữ liệu nào nên Uro-Vaxom nên được sử dụng trong quá trình cho con bú sau khi đánh giá cẩn thận tỷ lệ rủi ro / lợi ích.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

Cho đến nay chưa có nghiên cứu nào được thực hiện. Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

Tương tác, tương kỵ của thuốc: Hiện tại chưa có tương tác thuốc nào được ghi nhận.

Tác dụng không mong muốn của thuốc: Tác dụng không mong muốn được thể hiện bởi các cơ quan và tần suất chúng được quan sát thấy trong các thử nghiệm lâm sàng và / hoặc trong quá trình theo dõi thực tế trong thời gian sử dụng Uro-Vaxom. Các tần suất được xác định như sau:

Thường gặp: < 1/10 đến ≥ 1/100;

Ít gặp: < 1/100 đến ≥ 1/1000;

Hiếm gặp: < 1/1.000 đến ≥ 1/10.000;

Rất hiếm gặp: ít hơn < 1/10.000, và bao gồm một số trường hợp cá biệt.

Rối loạn hệ miễn dịch: Ít gặp: quá mẫn; Rất hiếm gặp: phù miệng

Rối loạn hệ thần kinh: Thường gặp: đau đầu

Rối loạn hệ tiêu hóa: Thường gặp: buồn nôn, tiêu chảy, không dung nạp dạ dày, khó tiêu; Ít gặp: đau bụng.

Rối loạn ngoài da và các mô dưới da: Ít gặp: phát ban, ngứa; Rất hiếm gặp: rụng tóc

Rối loạn chung và rối loạn tại chỗ tiêm: Ít gặp: sốt; Rất hiếm gặp: phù ngoại biên

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc

Quá liều và cách xử trí:

Quá liều: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

Xử trí: Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

Quy cách đóng gói:

Hộp 3 vỉ nhôm, mỗi vỉ chứa 10 viên nang.

Điều kiện bảo quản, hạn dùng của thuốc:

Không bảo quản thuốc trên 30°C và giữ vỉ thuốc nguyên vẹn.

Uro-vaxom có hạn dùng là 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không nên dùng thuốc sau ngày hết hạn được ghi trên bao bì sau chữ "EXP".

