



Ketosteril®

Rx Ketosteril®

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc. Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Thành phần công thức thuốc: 1 viên nén bao phim chứa:

Thành phần hoạt chất:

Acid (RS)-3-methyl-2-oxovaleric (α -ketoanalogue to DL-isoleucin), muối calci	67 mg
Acid 4-methyl-2-oxovaleric (α -ketoanalogue to leucin), muối calci	101 mg
Acid 2-oxo-3-phenylpropionic (α -ketoanalogue to phenylalanin), muối calci	68 mg
Acid 3-methyl-2-oxobutyric (α -ketoanalogue to valin), muối calci	86 mg
Acid (RS)-2-hydroxy-4-methylthio-butyric (α -hydroxyanalogue to DL-methionin), muối calci	59 mg
L-lysin acetat tương đương với 75 mg L-lysin	105 mg
L-threonin	53 mg
L-tryptophan	23 mg
L-histidin	38 mg
L-tyrosin	30 mg
Tổng lượng nitơ trong mỗi viên	36 mg
Calci trong mỗi viên	1,25 mmol $\approx$ 50 mg

Thành phần tá dược:

Bột ngô, crospovidon loại A, talc, silica khan dạng keo, magnesi stearat, macrogol 6000, quinolin vàng E104, butylat methacrylat copolymer, triacetin, titan dioxid E171, povidon K29-32.

Dạng bào chế:

Viên nén bao phim.

Chỉ định:

Phòng tránh và điều trị bệnh do rối loạn hoặc suy giảm cơ chế chuyển hoá protein trong bệnh suy

thận mạn, khi lượng protein trong chế độ ăn bị hạn chế ở mức dưới 40 g/ngày (đối với người lớn). Thường chỉ định cho các bệnh nhân có mức lọc cầu thận (GFR) dưới 25 ml/phút.

Cách dùng, liều dùng:

Liều dùng:

Nếu không có chỉ định khác: dùng 3 lần một ngày, mỗi lần 4 - 8 viên, uống ngay trước bữa ăn, liều này dùng cho người lớn (cân nặng khoảng 70 kg). Không được nhai viên thuốc.

Dùng thuốc cùng với thức ăn làm tăng khả năng hấp thu và chuyển hóa các acid amin có trong thành phần thuốc.

Chưa có tài liệu nghiên cứu nào nói về việc sử dụng thuốc này cho trẻ em.

Cách dùng:

- Đường dùng: Dùng qua đường uống.
- Thời gian dùng thuốc:

Viên nén Ketosteril có thể sử dụng lâu dài nếu mức lọc cầu thận (GFR) dưới mức 25 ml/phút, đồng thời lượng protein trong chế độ ăn hàng ngày phải hạn chế dưới mức 40 g (đối với người lớn).

Chống chỉ định:

Bệnh nhân mắc cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Bệnh nhân bị tăng calci huyết. Bệnh nhân bị rối loạn chuyển hoá acid amin.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

Cần theo dõi thường xuyên mức calci trong huyết thanh. Đảm bảo cung cấp đầy đủ calo.

Hiện vẫn chưa có dữ liệu về việc dùng thuốc này cho bệnh nhi. Thận trọng khi sử dụng thuốc cho bệnh nhân mắc rối loạn chuyển hóa (phenylketonuria) di truyền, vì trong thành phần của thuốc có phenylalanin.

Chú ý theo dõi nồng độ phosphat trong huyết thanh nếu Ketosteril được dùng đồng thời với nhôm hydroxid.